

RISOLUZIONE DELL' OCCLUSIONE INTESTINALE



DUBBI SULLA VASCOLARIZZAZIONE E VITALITA' INTESTINALE?



1 FL DI **VERDYE** DA **25 MG 5MG/ML** + **10 ML** DI ACQUA  
STERILE PER PREPARAZIONE INIETTABILI



BOLO EV DI **2 ML** DI SOLUZIONE

N.B. Nonostante la ripetibilità dei boli ev, si raccomanda comunque di non superare la dose massima raccomandata nel foglio illustrativo del prodotto



OSSERVAZIONE DEL TRATTO COMPROMESSO DAL MOMENTO DELL'INIEZIONE  
FINO AL PRIMO SEGNO DI FLUORESCENZA

N.B. osservare sia la fase arteriosa che lo scarico venoso. Utile confronto con ansa vitale attigua



EVENTUALE RIPETIZIONE DEL BOLO E DELL'OSSERVAZIONE DOPO IRRIGAZIONE  
CON ACQUA CALDA SE NECESSARIO



**DECISIONE** RESEZIONE VS CONSERVAZIONE



SCATTARE FOTO O BREVE VIDEO



INVIO SU GRUPPO **TELEGRAM** OPPURE SUCCESSIVAMENTE CARICARE IL  
FILE SUL **Google Form** INDICANDO il file con **ID centro** seguito da un trattino e **ID  
paziente**